



DATI PROGRAM JE ORJENTACIONI. **PRATITI IZVEŠTAVANJA PIS** (PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE)!

BOLESTI I ŠTETOČINE	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR
BAKTERIOZNA PLAMENJAČA (<i>Erwinia amylovora</i>)								
ČAĐAVA KRSTAVOST								
JABUČNI SMOTAVAC								
LISNE VAŠI								
KRUŠKINA BUVA								
CRVENI PAUK								
MRAZOVCI								
KRUŠKINA OSA								
CAPUA RETICULANA (SAVIJAČ)								
DRUGI SMOTAVCI								
DRUGE ŠTETOČINE								


Smot.crveni i zeleni (Mart, April, Maj)
 Crvlj.mlađih plodova (Maj, Jun, Jul)
 Smot.crveni i zeleni (Jul, Avgust, Septembar)
 Krušk.cvetojed (Maj, Jun)
 Lisni mineri (Avgust, Septembar)




1) Bubrenje pupoljaka
0-09
Plavi preparati +
Belo ulje




4) Beli baloni
57-60
Kingbo AS 0,2% +
Perperin 0,2%
*




6) Precvetavanje
65-69
Kingbo AS 0,2% +
Perperin 0,2%



8) Rast ploda
74-79
Aposthole 0,2-0,15%
Kingbo AS 0,2%




2) Mišje uši
10
Kingbo AS 0,2% +
Perperin 0,2%




5) Početak cvetanja
60-65
Perperin 0,2%




7) Rast ploda
71-72
Chitosan 0,2-0,4%



9) Zrenje ploda
(protiv skladišnih bolesti)
81-87
Perperin 0,15% +
Chitosan 0,2%



3) Cvetni pupoljci
51-56
Chitosan 0,2% +
Kingbo AS 0,2%
*



10) Posle berbe
Kingbo AS 0,2%

SREDSTVA U PROGRAMU IMAJU PREVENTIVNO DEJSTVO PA IH TREBA KORISTITI PRI POJAVI PRVIH SIMPTOMA.

U MAJU, JUNU, JULU ILI AVGUSTU SE MOŽE POJAVITI POTREBA ZA DODATNIM TRETIRANJEM

* Može se kombinovati sa mineralnim uljem

NAPOMENA: NEOPHODNO JE VIZUELNO PRAĆENJE BROJA JEDINKI KRUŠKINE BUVE. NAJBITNIJI JE PRAVOVREMENI TRETMAN SA KINGBO-m. U SLUČAJU POJAČANOG NAPADA SPLIT APLIKACIJA NA 4 DANA