



## Zaštita vinove loze

Vreme zaštite	Razlog tretiranja /bolest	Preparat	doza /koncentracija
Pucanje pupoljaka	Crna pegavost (Phomopsis viticola)	Bakarni preparati mineralno ulje	
Razvijeno 2-3 lista	Crna pegavost Pepelnica	Chitosan	0,3%
	Eriofidne grinje	Kingbo AS	0,2%
Razvijeno 5-6 listova	Pepelnica (Unicula necator) Plamenjača (Plasmopara viticola) Folijarna ishrana	Vegard AS	0,2-0,4%
Odvajanje cvetova	Pepelnica	Chitosan	0,2%
	Plamenjača	Aposthole	0,2%
	Groždani moljac	Kingbo AS	0,2%
Početak cvetanja	Bolja oplodnja cvetova	Chitosan	0,2%
Otpalo 80% cvetnih kapica	Pepelnica	Aposthole	0,2%
	Plamenjača	Chitosan	0,2%
	Siva trulež		
	Cikade vektori Folijarna ishrana	Kingbo AS	0,2%
Grozdovi počinju da vise	Plamenjača	Vegard AS	0,2-0,4%
	Cikade vektori Fitoplazme		
	"Flavescence doree"* Folijarna ishrana	Kingbo AS	0,2%
Početak dodirivanja bobica	Plamenjača		
	Pepelnica	Perperin, Chitosan	0,2%
	Siva trulež		
	Eriofidne grinje	Kingbo AS ili	0,2%
	Groždani moljac Folijarna ishrana	Aposthole	0,2%
Početak zrenja	Plamenjača	Chitosan	0,2%
	Siva trulež, Crna trulež	Aposthole	0,2%
	Drozophila suzukii	Kingbo AS	0,2%
3 nedelje pred berbu	Siva trulež, Crna trulež	Chitosan, Perperin	0,2%, 0,2%

Vegard / Chitosan: niže doze od 0,2% koristiti preventivno; 0,3% u slučaju pojave infekcije.

Pratiti izveštavanja pis (prognozno izveštajne službe) za lokalno područje !

\* Protiv fitoplazme jedina sigurna mera je suzbijanje vektora i stalna kontrola i uklanjanje bolesnih biljaka!