

U dosadašnjoj praksi Vegard AS (Rabarbara) je pokazao izuzetno širok spektar primene.

Pri korišćenju ovog preparata mora se imati na umu da efikasnost preparata zavisi od vremena primene.
Pri prvoj upotrebi Vegard-a AS obavezno konsultovati distributera.

Spektar delovanja:

suzbijanje prouzrokovane bolesti voća i povrće na otvorenom i u zatvorenom prostoru, bolesti žitarica:

- **pepelnice, plamenjače, sive truleži i antraknoze**
- **plamenjače** (u krastavcu preventivno, pre pojave simptoma bolesti, a najkasnije odmah po pojavi prvih simptoma kod salatara, a kod kornišona od pojave prvih pravih listova pa do kraja berbe, pod uslovom da nije došlo do jače pojave simptoma u koncentraciji 0,2-0,3%),
- **bakterijske plamenjače voća, povrća i vinove loze**
- **pepelnice, rđe žita**
- **virusne bolesti paprike, paradajza, krastavca, tikve, dinje, lubenice, duvana**
- sušenja cvetova, grančica (**Monilia laxa**) i mrke truleži plodova koštčavog voća (**Monilia fructigena**) od pojave **belih balona (kokica)** do završetka formiranja ploda.
- pravovremeno primjenjen, sprečava razvoj **Taphrine deformans** na breskvi.
- **sušenje lastara** maline i kupine (Didymella app, nakon berbe i od početka kretanja vegetacije)
- u gajilištu pečuraka za suzbijanje **zelene plesni 4-6ml/m2.**

Koncentracija primene: 0,2 – 0,4% uz detaljno orošavanje svih zelenih delova gajenih biljaka.

Preporučuje se njegova preventivna primena **tokom cele vegetacije**.

Može se koristiti **kao dodatak u programima** za zaštitu bilja u momentima kada je prioritet da se izbegnu problemi **izazvani uobičajenim ostacima pesticida u plodovima**.

Efikasnost na osnovu potvrđene primene u praksi, počev od 2013 godine:

suzbijanje **plamenjače, pepelnice** krastavca i paprike - selo Nikinci,

suzbijanje **sive truleži** maline, višnje, kupine – Ljubovija, Loznica, Valjevo (u 2014 godini bolja efikasnost od konvencionalnih preparata, 2016 efikasniji od Timorex Gold-a)

suzbijanje **rđe** na žitu (Pančevo, Bela Crkva organska proizvodnja).

suzbijanje **monilije i kokomicesa** - naizmenična primena Chitosana i Vegarda, nakon uklanjanja oštećenih listova (zasad trešnje-Vrčin)

sušenje **lastara** (Didymela) maline i kupine, primena nakon berbe u koncentracija 0,3% - Loznica

bakterijske plamenjače split aplikacija Chitosan i Vegard u koncentraciji 0,4% (primena na paprici -Duvanište)

za suzbijanje **Dactylium-a** za pripremu pokrivke u gajilištu u dozi 1 lit na 400 briketa (100m²) 3 i 5 dana (proizvođač šampinjona Vranovo, Radinci, Mladenovac)

suzbijanje **bele plesljivosti pečuraka** Vegard 10ml/m² dvokratno po jednom zalivanju 5ml/m² (primena gajilište Bjeljina, Šabac)